




ÍGY KÉSZÜL EGY BOLYGÓTÉRKÉP




Először megjelenítjük az űrszondák adatait. A képen a MOLA lézeres magasságmérő magassági adatpontjaiból készített domborzati modell (DEM) adatai láthatóak. Az adathiányos helyeket átlagolt (interpolált) adatokkal töltjük ki.




A fent még szürke fényességértékekkel kódolt magassági adatokat színéssé alakítjuk. A térképeken itt a magas helyek barnák, a közepesek sárgák, majd fehérek, a mélyek pedig szürkék. A kéket és a zöldet kerüljük, hogy ne is emlékeztessen a földi vizekre és növényzetre.



A térképet térbelivé a domborzatárnyékolás teszi. Az árnyékokat vehetjük fényképekről, de szebb, ha számítógép alkotja az árnyékokat a DEM alapján. Az összes térképen, az egész bolygón északnyugat felől süt a nap, ami a valóságban lehetetlenség volna.



A vonalas és pontjeleket geológusok térképező munkái alapján helyezük a térképre. Minden formátípus-katalógus fényképek alapján végzett térképező kutatás eredménye. Térképek vagy táblázatok formájában szakkikkekben publikálták őket az elmúlt bő évtizedben.



Végül földhelyezzük az elkészült térképre a neveket. A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) és az Egyesült Államok Geológiai Szolgálat (USGS) közös adatbázisban közli az általuk engedélyezett nevek listáját. Évente pár új névvel bővül a lista, amiket kutatók igényelhetnek.

TOVÁBBI BOLYGÓTÉRKÉPEK AZ INTERNETEN:

Régi és új bolygóterképek: <http://planetarymapping.elte.hu>.
Bolygóterképek gyerekeknek: <https://gyerekerkep.wordpress.com>
Bolygóglóbuszok és éggömbök: <http://vgm.elte.hu>
Mozgatható országhatárok bolygók és holdak felszínén: <http://countrymovers.elte.hu/>

KISZÁMOLÓ!

Készen állsz rá, hogy kiszámold, hány fok van a Marson, és miért nem annyi? Először próbálgassuk matematikai szarjainkat a Földön, aztán irány a Mars.

Vegyük először a **napállandót** a Föld távolságában: ez 1370 W/m^2 . Ennyi energia ér egy 1 m^2 -es sík lapot. Ezt az energiát szét kell osszuk a gömb alakú égitest felszínén (ahol a sarkokon alacsony szögben érzékel a fény, a gömb egyik oldalán pedig sötét éjszaka van); majd ki kell vonjuk a visszavert energiát: nem az összes energia jut le a felszínre, mert a felhők, a hó, a homok stb. a bejövő fény 30%-át visszaküldi az űrbe (az **albedó**: 0,3). Így

$$E = \text{napállandó} \times (1 - \text{albedó}) / 4$$

ahol $E = A$ bolygófelszínre átlagosan eső energia [W/m^2]

Miért /4: mert a gömb felszíne négyszer akkora, mint egy ugyanakkora sugarú kör (földkorong) területé.

Ebből $E = 240 \text{ W/m}^2$, azaz 240 W energia érkezik a Földön egy m^2 -re. Hogy ne főjön meg a felszín minden, ugyanennyi energiának távoznia is kell a Földről, azaz kisugárzódnia a világűrbe.

Most váltsuk át az energiát hőmérsékletre. A bejövő energia a következő hőmérsékletre melegíti fel a bolygót (átlagosan):

$$T = \sqrt[4]{E/\sigma}, \text{ azaz } T = (E/\sigma)^{0,25}$$

ahol

$T =$ hőmérséklet [K]

$E =$ bejövő energia [W/m^2]

$\sigma =$ Stefan-Boltzmann állandó = $5,670373 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$

Ebből a Föld **átlaghőmérséklete**

255 K [Kelvin], azaz -18°C lenne

($^\circ\text{C} = \text{K} - 273$). Mérésekből (vagyis tapasztalati alapon) az derül ki, hogy a Föld valójában átlagosan $+14^\circ\text{C}$ -os.

A különbséget az üvegházhatás okozza: a légkör megtart valamennyi energiát és nem engedi ki az űrbe.

KÉRDÉS: Mennyi az üvegházhatás

a Marson? Ehhez ki kell számolni,

mennyi lenne a Mars hőmérséklete az adatok alapján (T_{Mar}) és megnézni, ez mennyivel tér el a mérésektől. A fenti számításokat kell az alábbi adatokkal megismételni (számológép elég hozzá):

› A Marsnál a napállandó 593 W/m^2

› A Mars albedója 0,24

› A Mars átlaghőmérséklete a mérések alapján 218 K (-55°C)

T_{Mar}

Üvegház-
hatás:

Megoldásod ellenőrizheted a 188. oldali pincebogaraknál!